

(注) 接種間隔の起算日は、接種した日の翌日です。

ワクチンの種類	対象者	接種回数	接種回数と接種間隔	標準的な接種期間	接種可能年齢(期間)	
B型肝炎	1歳に至るまでの間にある者	初回:2回 追加:1回	初回:27日以上 追加:第1回目の注射から139日以上	生後2か月に至った時から生後9か月に至るまでの期間  (2か月になる日の前日から9か月になる日の前日まで)	1歳のお誕生日の前日まで  胎内又は産道感染のおそれがあり、免疫グロブリン投与、ワクチン投与を受けたことのある者については、定期接種の対象者から除く。  長期療養特例あり	
Hib	生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者	初回接種開始時に生後2か月から生後7か月に至るまでの間にある者			初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで  追加接種は、初回接種後7か月から13か月までの間隔をおく	初回:2か月になる日の前日から1歳のお誕生日前日まで
		初回:3回 追加:1回	初回:生後12か月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上 追加:初回接種終了後7か月以上  生後12か月までに3回の初回接種を終了せずに、生後12か月以降に追加接種を行う場合:初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上			
		初回接種開始時に生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでの間にある者			追加接種は、初回接種後7か月から13か月までの間隔をおく	初回接種は、1歳のお誕生日前日までに行うこととし、それを超えた場合は行わない。  追加:6歳の誕生日前日まで
		初回:2回 追加:1回	初回:生後12か月に至るまでの間に、27日(医師が必要と認めるときは20日)以上 追加:初回接種終了後7か月以上  生後12か月までに2回の初回接種を終了せずに、生後12か月以降に追加接種を行う場合:初回接種終了後27日(医師が必要と認めるときは20日)以上			
		初回接種開始時に生後12か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者				
1回						

ワクチンの種類	対象者	接種回数	接種回数と間隔	標準的な接種期間	接種可能年齢(期間)	
小児用肺炎球菌	生後2か月から生後60か月に至るまでの間にある者	初回接種開始時に生後2か月から生後7か月に至るまでの間にある者			初回接種開始は、生後2か月から生後7か月に至るまで	初回:2か月になる日の前日から2歳のお誕生日前日まで
		初回:3回 追加:1回	初回:生後24か月に至るまでの間に、27日以上 追加:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降において、1回  初回2回目の接種が生後12か月を超えた場合、3回目の接種は行わない。	追加接種は、生後12か月から生後15か月に至るまで		
		初回接種開始時に生後7か月に至った日の翌日から生後12か月に至るまでの間にある者			追加接種は、生後12か月から生後15か月に至るまで	追加:1歳のお誕生日前日から6歳の誕生日前日まで
		初回:2回 追加:1回	初回:生後24か月に至るまでの間に、27日以上  追加:初回接種終了後60日以上の間隔をおいて、生後12か月に至った日以降において、1回	初回接種は、2歳のお誕生日前日までにを行うこととし、それを超えた場合は行わない。		
		初回接種開始時に生後12か月に至った日の翌日から生後24か月に至るまでの間にある者				
		2回	60日以上の間隔をおいて2回行う。(初回1回目・追加)			
		初回接種開始時に生後24か月に至った日の翌日から生後60か月に至るまでの間にある者				
1回(追加)						
4種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・ポリオ) DPT-IPV	第1期:生後3か月から生後90か月に至るまでの間にある者	初回:3回 追加:1回	初回接種 20日以上の間隔をあけて3回接種  追加接種 第1期初回接種(3回)終了後、6月以上をあけて1回接種	生後3か月に達した時から、生後12か月に達するまでの期間  第1期初回接種(3回)終了後、12か月から18か月までの間隔をおく	第1期:3か月になる日の前日から7歳6か月になる日の前日まで	
2種混合(ジフテリア・破傷風) DT	第2期:11歳以上13歳未満の者	1回	1回	11歳に達した時から12歳に達するまでの期間	第2期:11歳のお誕生日前日から13歳のお誕生日前日まで	

ワクチンの種類	対象者	接種回数	接種回数と間隔	標準的な接種期間	接種可能年齢(期間)
結核(BCG)	1歳に至るまでの間にある者	1回	1回	生後5か月に達した時から生後8か月に達するまでの期間	1歳のお誕生日の前日まで
麻しん風しん(MR)	第1期:生後12か月から生後24か月に至るまでの間にある者	1回	1回	麻しん又は風しんに既に感染したものについても、混合ワクチンを使用することが可能である。	第1期:1歳のお誕生日前日から2歳のお誕生日前日まで
	第2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にある者	1回	1回		第2期:小学1年生になる前の年(年長)の4月2日から1年後の4月1日まで
水痘	生後12か月から生後36か月に至るまでの間にある者	2回	3か月以上(標準的には6か月から12か月まで)の間隔で2回接種	1回目の注射は生後12か月から生後15か月に達するまで 2回目の注射は、1回目の注射終了後6か月から12か月までの間隔をおく	1歳のお誕生日の前日から3歳のお誕生日前日まで
日本脳炎	第1期初回:生後6か月から生後90か月に至るまでの間にある者	初回:2回 追加:1回	初回	3歳に達した時から4歳に達するまでの期間	第1期:6か月になる日の前日から7歳6か月になる日の前日まで
			6日以上の間隔で2回接種	追加接種	
	第2期:9歳以上13歳未満の者	1回	1回	9歳に達した時から10歳に達するまでの期間	第2期:9歳のお誕生日前日から13歳のお誕生日前日まで